

流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗

3種疫苗可同時分別於不同部位接種唷!親愛的鄉親本縣將於115年10月1日開打

一、公費流行性感冒疫苗&新冠疫苗

開打日期	接種對象	公費 流感疫苗	公費 新冠疫苗	應備文件	接種地點
第一階段 10/1開打	65歲(含)以上長者。	○	○	健保卡	衛生所 合約院所
	55歲以上原住民。	○	○	健保卡 戶籍謄本或 戶口名簿	
	安養、長期照顧(服務)等機構 之受照顧者及其所屬工作人員。	○	○	健保卡 依符合造冊名單	
	孕婦。	○	○	健保卡 孕婦健康手冊	
	醫事及衛生防疫相關人員。 (註:新增「具執業登記之公共 衛生師」)	○	○	健保卡 執業執照/ 依符合造冊名單	
	幼兒園托育人員、托育機構 (廚工及行政人員等)非臨時性 工作人員及居家托育人員(保母)。	○	○	健保卡 職員證或在職證明	
	6個月內嬰兒之雙親或實際扶養者。	○	○	健保卡 「嬰兒出生證明文件」 或完成「新生嬰兒登 記之戶口名簿」或 「足堪認定與被收養/ 寄養嬰兒有『先行共 同生活』之證明文件	
	滿6個月以上之嬰幼兒。	○ 6個月以上至 國小入學前幼兒	○ 從未接種COVID-19 疫苗之滿6個月以上 至未滿6歲幼兒	健保卡 兒童健康手冊	
	具潛在疾病者(包括高風險慢性病人、BMI≥30者、罕見疾病患者 及重大傷病患者)。	○	○ 另納入結核病、失 能、精神疾病及失 智症患者(依公費 抗病毒藥物條件)	健保卡 重大傷病卡或其 它相關證明文件	
	國小、國中、高中、高職、五 專一至三年級學生。	○	×	健保卡 依符合造冊名單	採學校集中 接種為主
第二階段 11/2開打	禽畜相關及動物防疫相關人員。	○	×	健保卡 依符合造冊名單	衛生所
	50至64歲無高風險慢性病成人。	○	○	健保卡	衛生所 合約院所

二、成人公費肺炎鏈球菌疫苗

目前我國提供公費施打的肺炎鏈球菌疫苗有20與21價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV20/21)兩種。

一、接種對象

- 1.65歲(含)以上長者
- 2.19-64歲IPD高風險對象
- 3.55-64歲原住民


二、接種原則

- 1.從未接種20價、21價、13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV20/21/13/15)或PPV23者，應接種1劑PCV20或PCV21。
- 2.曾經接種肺炎鏈球菌疫苗者，依下列原則接種：
 - (1)曾接種PPV23者，間隔至少1年可接種1劑PCV20或PCV21。
 - (2)曾接種PCV13/15者，間隔至少1年(高風險對象間隔至少8週)可再接種1劑PPV20或PCV21。
- 3.如已接種過(1)PCV20、(2)PCV13/15+PPV23、(3)PCV21者，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV20C或PCV21疫苗。

※IPD高風險對象定義：脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、「一年內」接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者。



流感疫苗接種須知



保護效果：

疫苗的保護效果需視當年使用的疫苗株是否與實際流行的病毒株型別相符、以及不同年齡或身體狀況而異，平均約為30-80%。對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有48%，入住加護病房的流感重症保護力則可達82%。6個月至未滿18歲兒童青少年族群接種流感疫苗之保護力與成人相仿。由於每年流行的流感病毒型別不一定相同，因此，每年均須重新接種。本計畫使用依據世界衛生組織每年對北半球建議價數（三價/四價）及抗原成分之流感疫苗，其保護效力與國際各國狀況相同。接種後至少約需2週的時間以產生保護力，其保護效果可持續1年。完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他病毒所引起的呼吸道感染，請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。

接種禁忌：

1. 已知對疫苗的成分有過敏者，不予接種。
2. 過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。



接種注意事項：

1. 發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。
2. 出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
3. 先前接種本疫苗6週內曾發生Guillain-Barré症候群（GBS）者，宜請醫師評估。
4. 其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

接種後照顧：

(一)疫苗安全性說明：

1. 正常反應：可能出現注射部位疼痛、紅腫，或輕微發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心等，通常1~2天內自然恢復。
2. 嚴重反應：極罕見(如過敏性休克)，通常於接種後數分鐘至數小時內出現。
3. 雞蛋過敏者接種建議：根據國際研究與世界衛生組織建議，對雞蛋過敏者可安心接種流感疫苗，其過敏反應發生率並未因雞蛋過敏病史而增加。
4. 孕婦接種建議：現有研究結果與世界衛生組織報告均顯示，孕婦於懷孕期間接種不活化流感疫苗，並未增加妊娠及胎兒不良事件之風險。
5. 罕見神經系統風險：極少數零星報告提及神經系統症狀（如 Guillain-Barré 症候群），惟除特定年度疫苗外，目前尚無確切統計數據證明與接種流感疫苗有直接關聯。

(二)接種後注意事項：

1. 現場留觀：接種後應於單位或附近休息觀察 15 分鐘。
2. 凝血異常者：使用抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後應加壓至少 2 分鐘並觀察有無出血。
3. 緊急就醫：若持續發燒超過48小時、意識改變、呼吸困難或心跳加速，應儘速就醫並主動告知醫師疫苗接種史，並同步通報學校師長。
4. 維持良好衛生習慣：接種流感疫苗後仍可能罹患其他呼吸道感染，請維持良好衛生習慣，維護健康。

